

Anwendungsmöglichkeiten von Butorphanol beim Hund

Prämedikation

| Wirkstoff/Kombination/ Dosierung | Bemerkung | Quelle |
|--|---|---|
| Carprofen 2,2 mg / kg KGW p. o. Butorphanol 0,4 mg / kg KGW | Carprofen 3 Stunden vor Narkoseeinleitung | Ko 2000 |
| Medetomidin 10 µg / kg KGW i.m. Butorphanol 0,1 mg / kg KGW i.m. | | Muir 1999 |
| Acepromazin 0,02 mg / kg KGW i.m. o. i.v. Butorphanol 0,1 mg / kg KGW i.m. o. i.v. | | Butorphanol-Zulassung UK |
| Butorphanol 0,1-0,2 mg / kg KGW i.v., i.m., s.c. | | Institut für Veterinärphar- makologie und – toxikologie, Uni Zürich, Alvegesic® 0,2% |

Sedation

| Wirkstoff/Kombination/ Dosierung | Bemerkung | Quelle |
|--|-----------|--------------------------|
| Medetomidin 10-30 µg / kg KGW i.m. Butorphanol 0,1-0,2 / kg KGW mg i.m. | | Intervet Fachinformation |
| Acepromazin 0,05 mg / kg KGW i.m. Butorphanol 0,2 mg / kg KGW i.m. | | Kojima, 1999 |

Anästhesie

| Wirkstoff/Kombination/ Dosierung | Bemerkung | Quelle |
|---|-----------|--|
| Medetomidin 20 µg / kg KGW i.m. Butorphanol 0,1 mg / kg KGW i.m. | | Ambrisko 2005 |
| Medetomidin 20 µg / kg KGW i.m. Midazolam 0,5 mg / kg KGW i.m. Butorphanol 0,1 mg / kg KGW i.v. | | Itamoto 2000 |
| Butorphanol 0,1 mg / kg KGW i.m. Medetomidin 20 µg / kg KGW i.m. Ketamin 5 mg / kg KGW i.m. | | Tomizawa 1994, Butorphanol-Zulassung UK |

Analgesie

| Wirkstoff/Kombination/ Dosierung | Bemerkung | Quelle |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Butorphanol 0,2-0,4 mg / kg KGW i.v. | | Intervet Fachinformation |

Antitussiva

| Wirkstoff/Kombination/ Dosierung | Bemerkung | Quelle |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| Butorphanol 0,05-0,10 mg / kg KGW | bei unproduktivem Husten | Institut für Veterinärphar- makologie und – toxikologie, Uni Zürich, Morpasol-4 ad us.vet. |